

**セアカゴケグモに
ご注意!!**



さわらない！

見つけたら素手でつかまない！

私のプロフィール

私には 背中に赤い
帯状の模様があります
オスにはありません

私たちは
“暖かい”ところが
大好きです！
寒いところは苦手です

私たちは“卵のう”という
袋に子どもを産みます

こどもは 1回あたり
卵のうで3～5ヶ
(500匹ほど)
産まれます！

卵のう



実物大



メス…体長10mm程度
全体に黒く背に赤色の帯状の模様
のあるのが特徴です

私たちのすみ家は
1ページから!!
ご覧ください!

セアカゴケグモの — 雑 学 —

- 本名は、節足動物部門クモ綱クモ目ヒメグモ科セアカゴケグモです。
ちなみに学名は、*Latrodectus hasseltii*です。
- 寿命は、ほぼ1年とされています。
- 出身は、オーストラリアやニュージーランド等で平成7年に大阪の高石市で発見されました。
そう、いわゆる“特定外来生物”です。
- 大阪府では万一に備え、抗毒素血清を常備しています。
- オスは小さくて3mm位で、特徴的な赤い模様がなく、白っぽく見えます。
ちなみに下の写真のようです。



実物大



もくじ

セアカゴケグモはこんな所にいる!!

住宅編

1P

セアカゴケグモはこんな所にいる!!

公園編

2P

自宅（施設）の周りの確認と駆除をするには

3P


もしもセアカゴケグモに咬まれたら…

4P

大阪府保健所一覧

裏

セアカゴケグモ はこんな所にいる!! 住宅編



セアカゴケグモ はこんな所にいる!! 公園編



自宅(施設)の周りの 確認と駆除をするには

1

見つけ方

クモの巣で見分けましょう

セアカゴケグモの巣



- ・落ち葉等を付けた不規則な巣(網)
- ・地面近くでかたい(粘りけの強い)糸

在来クモの巣



- ・糸だけのきれいな網状の巣
- ・空中にある巣、やわらかい糸

2

駆除作業の方法



ゴキブリ用スプレーなどを巣全体に吹きかけます



セアカゴケグモが飛び出したら、弱ったのを確認してふみ潰します



棒などで巣を取り出します



卵のう(卵の入った袋:直径約1cm)をふみ潰します



火気を使用する(できる)場合は、巣ごと燃やします

もう一度、安全確認をしましょう

生き残った子グモが大きくなった頃(2~3週間後)に、駆除したところを再確認しましょう

準備物



厚手の手袋(軍手など)
必ず手袋をはめて!
(薄手のゴム手袋は×)



ゴキブリ用殺虫スプレー
(ピレスロイド系)
成虫に噴射します
(卵のうには効きません)



草焼きバーナー
巣ごと燃やせます
(火の取り扱いには十分注意)



針金・さいばしなど
巣の掻き出しなどに便利

もしも **セアカゴケグモ** に咬まれたら…

咬まれた時の処置の仕方



万一、クモに咬まれたら…



傷口を流水で洗い、患部を冷やします。包帯や止血帯はしないほうがよいでしょう。



市販の家庭用殺虫剤（ゴキブリ用ピレスロイド系）でクモを殺します。



患部を冷やしながら、直ちに病院に行きましょう。乳幼児の場合は救急車を呼びましょう。

病院には、咬まれたクモを殺して持参した方が適切な治療につながります。



咬まれた時の症状

- 咬まれるとはじめはチクリと針で刺したような痛みを感じます。（すぐに痛みを感じないこともあります。）
 - やがて咬まれた部分のまわりが腫れて赤くなります。痛みは次第に全身に広がることもあります。
 - 悪化すると全身症状（吐き気、さむけ等）が現れることもあります。
 - 通常は、数日から数ヶ月で回復する例が多いです。
- ※なお、重症化（全身症状）した場合は、大阪府立急性期・総合医療センターに抗毒素血清を常備しています。